

大腸癌

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	特記事項	頻度の高い副作用※				
カペシタビン	ゼローダ	術後	2投1休 6ヶ月	必要	—	手足症候群	食欲不振	骨髄抑制	肝機能障害	全身倦怠感
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	術後	4投2休 6ヶ月～	必要	—	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	色素沈着	下痢
トリフルリジン ・チピラシル	ロンサーフ	3rd以降	5日内服2日休薬 ×2 14日休薬	—	—	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	下痢	口腔粘膜炎
レゴラフェニブ	スチバーガ	3rd以降	3投1休	—	—	高血圧	手足症候群	下痢	食欲不振	発声障害
テガフル・ウラシル	ユーエフティ	術後	4投1休 6ヶ月	—	ホリナート併用	骨髄抑制	肝機能障害	下痢	口腔粘膜炎	食欲不振
テガフル・ウラシル	ユーエフティ	—	連日	—	—	食欲不振	骨髄抑制	下痢	肝機能障害	色素沈着
ドキシフルリジン	フルツロン	—	連日	—	—	下痢	食欲不振	腹痛	ビリルビン上昇	色素沈着

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。