

非小細胞肺癌

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	特記事項	頻度の高い副作用※				
アフチニブ	ジオトリフ	－	連日	－	－	下痢	EGFR阻害関連皮膚障害	口腔粘膜炎	食欲不振	肝機能障害
アレクチニブ	アレセンサ	－	連日	－	－	便秘	発疹	味覚障害	肝機能障害	骨髄抑制
クリゾチニブ	ザーコリ	－	連日	－	－	視覚障害	食欲不振	下痢	便秘	むくみ
ダブラフェニブ ／トラメチニブ	タフィンラー ／メキニスト	－	連日	－	－	発熱	発疹	食欲不振	口腔粘膜炎	肝機能障害
エルロチニブ	タルセバ	－	連日	－	－	EGFR阻害関連皮膚障害	下痢	口腔粘膜炎	食欲不振	肝機能障害
ゲフィチニブ	イレッサ	－	連日	－	－	EGFR阻害関連皮膚障害	下痢	肝機能障害	食欲不振	口腔粘膜炎
オシメルチニブ	タグリッソ	－	連日	－	－	EGFR阻害関連皮膚障害	下痢	口腔粘膜炎	骨髄抑制	肝機能障害
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	－	4投2休	必要	－	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	色素沈着	下痢
テボチニブ	テブミトコ	－	連日	－	－	体液貯留	食欲不振	下痢	腎機能障害	肝機能障害
テガフル・ウラシル	ユーエフティ	術後	連日	－	－	食欲不振	骨髄抑制	下痢	肝機能障害	色素沈着
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	－	3投2休	必要	<S1+CDDP> CDDPをDay8に 施行	骨髄抑制	食欲不振	下痢	口腔粘膜炎	色素沈着

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。