

胃癌

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	特記事項	頻度の高い副作用※				
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	術後	4投2休 1年間	必要	—	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	色素沈着	下痢
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	術後	1～7kur：2投1休 8kur～：4投2休 1年間	必要	<S1 + DTX> 2～7kurのみ DTX併用	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	脱毛	下痢
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	1st	3投2休	必要	<S1 + CDDP> CDDPをDay8に 施行	骨髄抑制	食欲不振	下痢	口腔粘膜炎	全身倦怠感
トリフルリジン ・チピラシル	ロンサーフ	3rd以降	5日内服2日休薬 ×2 14日休薬	—	—	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	下痢	口腔粘膜炎
テガフル・ウラシル	ユーエフティ	—	連日	—	—	食欲不振	骨髄抑制	下痢	肝機能障害	色素沈着
ドキシフルリジン	フルツロン	—	連日	—	—	下痢	食欲不振	腹痛	ビリルビン上昇	色素沈着

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。