

## 骨髄増殖性腫瘍

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	適応	頻度の高い副作用※				
						骨髄抑制	肝機能障害	下痢	体液貯留	発疹
ダサチニブ	スプリセル	—	連日	—	慢性骨髄性白血病	骨髄抑制	肝機能障害	下痢	体液貯留	発疹
イマチニブ	グリベック	—	連日	—	慢性骨髄性白血病	骨髄抑制	食欲不振	筋けいれん	むくみ	発疹
イマチニブ	グリベック	—	連日	—	(FIP1L1-PDGFR $\alpha$ 陽性)好酸球増多症候群 慢性好酸球性白血病	骨髄抑制	食欲不振	下痢	むくみ	発疹
ニロチニブ	タシグナ	—	連日	—	慢性骨髄性白血病	骨髄抑制	肝機能障害	発疹	食欲不振	頭痛
ヒドロキシカルバミド	ハイドレア	—	連日	—	慢性骨髄性白血病 本態性血小板血症 真性多血症	骨髄抑制	食欲不振	肝機能障害	発疹	—
アナグレリド	アグリリン	—	連日	—	本態性血小板血症	貧血	頭痛	動悸	下痢	むくみ
ルキソリチニブ	ジャカビ	—	連日	—	骨髄線維症 真性多血症	骨髄抑制	体重増加	下痢	疲労	肝機能障害

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。