

急性白血病

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	適応	頻度の高い副作用※				
ダサチニブ	スプリセル	—	連日	—	フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病	骨髄抑制	肝機能障害	下痢	体液貯留	発疹
イマチニブ	グリベック	—	連日	—	フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病	骨髄抑制	食欲不振	筋けいれん	むくみ	発疹
ヒドロキシカルバミド	ハイドレア	—	連日	—	急性骨髄性白血病 (公知申請)	骨髄抑制	食欲不振	肝機能障害	発疹	—
シタラピン オクホスファート	スタラシド	—	2～3週内服 2～3週休薬	—	急性骨髄性白血病	骨髄抑制	食欲不振	発熱	肝機能障害	全身倦怠感
トレチノイン	ベサノイド	—	連日	—	急性前骨髄球性白血病	TG上昇	APL分化症候群	肝機能障害	発熱	口唇乾燥
ギルテリチニブ	ゾスパタ	再発	連日	—	急性骨髄性白血病	骨髄抑制	肝機能障害	食欲不振	下痢	発熱

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。