

# 1. 悪性神経膠腫レジメン

	療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐性 リスク
初 発	Temozolomide+RT (42日)	テモダール	75mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1-42	70	中等度
	Temozolomide(150mg/m <sup>2</sup> )	テモダール	150mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1-5	28	中等度
	Temozolomide(200mg/m <sup>2</sup> )	テモダール	200mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1-5	28	中等度
	Bev+RT	アバスチン	10mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	14	最小度
	Bev+RT(維持療法)	アバスチン	15mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	21	最小度
再 発	Bev	アバスチン	10mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	14	最小度
	Temozolomide(150mg/m <sup>2</sup> )(維持療法)	テモダール	150mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1-5	28	中等度
	Temozolomide(200mg/m <sup>2</sup> )(維持療法)	テモダール	200mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1-5	28	中等度

※当院レジメン審査委員会にて承認され、登録されたレジメン一覧となっています。