

## 2. 頭頸部癌レジメン

	療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐性 リスク*1
NAC	CF	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21	高度
		5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1-5		
	CBDCA+5-FU (AUC=5)	カルボプラチン	AUC=5	60分	Day1	21	中等度
		5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1-5		
進行再発	CF+Cmab(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	21	高度
			250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day8,15		
		シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21	高度
		5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1-5		
	CF+Cmab(2回目以降)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1,8,15	21	高度
		シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1		
		5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1-5	21	高度
	CDDP+Cmab(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	28	高度
			250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day8,15		
		シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	28	高度
CDDP+Cmab(2回目以降)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1,8,15	28	高度	
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1			
Nivolumab	オプジーボ	240mg	30分	Day1	14	最小度	
PTX+CBDCA(AUC=2.5)+Cmab(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	21	中等度	
		250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day8,15			
	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1,8			
	カルボプラチン	AUC=2.5	60分	Day1,8	21	中等度	
PTX+CBDCA(AUC=2.5)+Cmab(2回目以降)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1,8,15	21	中等度	
	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1,8			
	カルボプラチン	AUC=2.5	60分	Day1,8			
PTX+CBDCA(AUC=2.5)+Cmab(維持療法)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	7	最小度	
PTX+Cmab(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	7	軽度	
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1			
PTX+Cmab(2回目以降)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	7	軽度	
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1			
weeklyPTX	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	1時間	Day1,8,15,22,29,36	49	軽度	
CRT	CF	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21	高度
		5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	24時間	Day1-5		
	CDDP	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21	高度
	Cmab(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	7	最小度
Cmab(2回目以降)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	7	最小度	

\*1 AUC4以上のカルボプラチンを含むレジメンおよび高度催吐性リスクレジメンはアプレピタントを使用

※当院レジメン審査委員会にて承認され、登録されたレジメン一覧となっています。