

4. 食道癌レジメン

	療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐性 リスク*1
C R T	FP+RT	シスプラチン 5-FU	70mg/m ² 700mg/m ²	60分 24時間	Day1 Day1-4	28	高度
N A C	FP	シスプラチン 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	60分 24時間	Day1 Day1-5	21	高度
A C	FP	シスプラチン 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	60分 24時間	Day1 Day1-5	28	高度
再 発 転 移	FP	シスプラチン 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	60分 24時間	Day1 Day1-5	28	高度
	5-FU+CDGP	アクプラ 5-FU	90mg/m ² 800mg/m ²	60分 24時間	Day1 Day1-5	28	中等度
	weeklyPTX	パクリタキセル	100mg/m ²	60分	Day1,8,15,22,29,36	49	軽度
	DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	開始10分60ml/hr、以降250ml/hr	Day1	21	軽度

*1 AUC4以上のカルボプラチンを含むレジメンおよび高度催吐性リスクレジメンはアプレピタントを使用

※当院レジメン審査委員会にて承認され、登録されたレジメン一覧となっています。