

## 6. 大腸癌レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐性 リスク*1
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	14	中等度
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	全開	Day1		
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	Day1		
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	14	中等度
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	全開	Day1		
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	Day1		
mFOLFOX6+BEV	アバスタチン	5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	14	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	全開	Day1		
FOLFIRI+BEV	アバスタチン	5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	14	中等度
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	全開	Day1		
FOLFOXIRI+BEV	アバスタチン	5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	14	高度
	イリノテカン	165mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	21	中等度
	ゼローダ		1日2回	Day1-14		
CAPOX + BEV	アバスタチン	7.5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	21	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
SOX+BEV	アバスタチン	7.5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	21	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
S-1+IRI(IRIS)(4週)	イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1,15	28	中等度
	エスワン		1日2回	Day1-14		
S-1+IRI+BEV(IRIS+BEV)(4週)	アバスタチン	5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1,15	28	中等度
	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1,15		
S-1+IRI+BEV(SIRB)(3週)	アバスタチン	7.5mg/kg	30分 (初回90分、2回目60分)	Day1	21	中等度
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	90分	Day1		
mFOLFOX6+CET(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	14	中等度
	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day8		
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1		
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	全開	Day1		
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	Day1		

	mFOLFOX6+CET(2回目以降)	アービタックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	250mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	60分 120分 120分 全開 46時間	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1	14	中等度
進行再発	FOLFIRI+CET(初回)	アービタックス アービタックス イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	400mg/m <sup>2</sup> 250mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	120分 60分 120分 120分 全開 46時間	Day1 Day8 Day1 Day1 Day1 Day1	14	中等度
	FOLFIRI+CET(2回目以降)	アービタックス イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	250mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	60分 120分 120分 全開 46時間	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1	14	中等度
	CET(初回)	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup>	120分	Day1	7	最小度
	CET(2回目以降)	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	7	最小度
	mFOLFOX6+PANI	ベクティビックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	6mg/kg 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	90分 120分 120分 全開 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14	中等度
	FOLFIRI+PANI	ベクティビックス イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	90分 120分 120分 全開 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14	中等度
	PANI	ベクティビックス	6mg/kg	90分	Day1	14	最小度
	IRI+PANI	ベクティビックス イリノテカン	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	90分 90分	Day1 Day1	14	中等度
	IRI+CET(初回)	アービタックス イリノテカン	400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	120分 60分 90分	Day1 Day8 Day1	14	中等度
	IRI+CET(2回目以降)	アービタックス イリノテカン	250mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	60分 90分	Day1,8 Day1	14	中等度
	FOLFIRI+RAM	サイラムザ イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	8mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	60分 120分 120分 全開 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14	中等度
	CAPIRI + BEV	アバスチン イリノテカン ゼローダ	5mg/kg 100mg/m <sup>2</sup>	30分(初回90分、2回目60分) 90分 1日2回	Day1,15 Day1,15 Day1-14	21	中等度
	BEV	アバスチン ロンサーフ	5mg/kg	30分(初回90分、2回目60分) 1日2回	Day1,15 Day1-5,8-12	28	中等度
	A C	mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	120分 120分 全開 46時間	Day1 Day1 Day1 Day1	14
CAPOX		オキサリプラチン ゼローダ	130mg/m <sup>2</sup>	120分 1日2回	Day1 Day1-14	21	中等度

\*1 AUC4以上のカルボプラチンを含むレジメンおよび高度催吐性リスクレジメンはアプレピタントを使用

※当院レジメン審査委員会にて承認され、登録されたレジメン一覧となっています。