

## 8. 泌尿器癌レジメン

	療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐性 リスク*1
前立腺癌	DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	開始10分60ml/hr、以降250ml/hr	Day1	21	軽度
	Cabazitaxel	ジェブタナ	25mg/m <sup>2</sup>	60分	Day1	21	軽度
膀胱・腎盂尿管癌	GEM+CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	30分 60分	Day1,8,15 Day2	28	高度
	GEM+CBDCA (AUC=5)	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> AUC=5	30分 60分	Day1,8 Day1	21	中等度
	Pembrolizumab	キイトルーダ	200mg	30分	Day1	21	最小度
腎細胞癌	Temsirolimus	トーリセル	25mg	60分	Day1	7	最小度
	Nivolumab	オプジーボ	240mg	30分	Day1	14	最小度
	Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ ヤーボイ	240mg 1mg/kg	30分 30分	Day1 Day1	21	最小度
精巣腫瘍	EP	エトポシド シスプラチン	100mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup>	90分 60分	Day1-5 Day1-5	21	高度
	VIP	ウロミテキサン イホマイド シスプラチン エトポシド	240mg/m <sup>2</sup> 1200mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	イホマイド同時から4時間毎 120分 60分 90分	Day1-5 Day1-5 Day1-5 Day1-5	21	高度
	BEP(Bleomycin30mg/body)	ブレオ エトポシド シスプラチン	30mg 100mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup>	15分 90分 60分	Day1,8,15 Day1-5 Day1-5	21	高度
	TIN	パクリタキセル アクプラ ウロミテキサン イホマイド	210mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup> 240mg/m <sup>2</sup> 1200mg/m <sup>2</sup>	180分 120分 イホマイド同時から4時間毎 120分	Day1 Day2 Day2-6 Day2-6	21	高度

\*1 AUC4以上のカルボプラチンを含むレジメンおよび高度催吐性リスクレジメンはアプレピタントを使用

※当院レジメン審査委員会にて承認され、登録されたレジメン一覧となっています。