

別表：体表面積別投与量

S-1			
用法：1日2回　4投2休			
体表面積			1回用量
		1.25㎡未満	40mg
1.25㎡以上	～	1.5㎡未満	50mg
1.5㎡以上			60mg

ゼローダ(A法：825mg/㎡/回)			
用法：1日2回　3投1休			
体表面積			1回用量
		1.31㎡未満	900mg
1.31㎡以上	～	1.64㎡未満	1200mg
1.64㎡以上			1500mg

ゼローダ(B法：1250mg/㎡/回)			
用法：	1日2回	2投1休	
体表面積			1回用量
		1.33㎡未満	1500mg
1.33㎡以上	～	1.57㎡未満	1800mg
1.57㎡以上	～	1.81㎡未満	2100mg
1.81㎡以上			2400mg

※大腸癌単剤の術後補助化学療法のみが適応

ゼローダ(C法：1000mg/㎡/回)			
用法：	1日2回	2投1休	
体表面積			1回用量
		1.36㎡未満	1200mg
1.36㎡以上	～	1.66㎡未満	1500mg
1.66㎡以上	～	1.96㎡未満	1800mg
1.96㎡以上			2100mg

ロンサーフ(35mg/㎡/回)			
用法：(5日内服、2日休薬)*2→2週休薬			
体表面積			1回用量
		1.07㎡未満	35mg
1.07㎡未満	～	1.23㎡未満	40mg
1.23㎡未満	～	1.38㎡未満	45mg
1.38㎡未満	～	1.53㎡未満	50mg
1.53㎡未満	～	1.69㎡未満	55mg
1.69㎡未満	～	1.84㎡未満	60mg
1.84㎡未満	～	1.99㎡未満	65mg
1.99㎡未満	～	2.15㎡未満	70mg
2.15㎡未満			75mg

別表：オレンシア

オレンシア			
用法：初回、2週、4週、以降4週間間隔			
体重			投与量
		60kg未満	500mg
60kg以上	～	100kg未満	750mg
100kg以上			1000mg