

多発性骨髄腫

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	特記事項	頻度の高い副作用※				
						食欲不振	下痢	末梢感覚神経障害	全身倦怠感	皮膚障害
イキサゾミブ	ニンラーロ	—	Day1,8,15内服 13日休薬	—	—	食欲不振	下痢	末梢感覚神経障害	全身倦怠感	皮膚障害
イキサゾミブ	ニンラーロ	—	Day1,8,15内服 13日休薬	—	<IRd> レブラミド、レナデックス併用	骨髄抑制	下痢	食欲不振	全身倦怠感	末梢感覚神経障害
レナリドミド	レブラミド	—	3投1休	必要	<Ld/Rd> 院内処方限定 レナデックス併用	骨髄抑制	便秘	全身倦怠感	末梢感覚神経障害	食欲不振
ボマリドミド	ボマリスト	—	3投1休	—	<Pd> 院内処方限定 レナデックス併用	骨髄抑制	便秘	全身倦怠感	末梢感覚神経障害	皮膚障害
サリドマイド	サレド	—	連日	—	単独投与 院内処方限定	便秘	洞性頻脈	末梢感覚神経障害	傾眠	骨髄抑制

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。